

# 癌化学療法輸液約束処方 大22

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用）

レジメン名 大22 Xeloda + BV

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与方法	投与経路	投与日	1コースの期間
アバステン	ベバシズマブ	BV	7.5 mg/kg	1コース目：90min	末梢 or CVポート	DAY 1	21日間
				2コース目：60min			
				3コース目以降：30min			
カペシタビン	カペシタビン	-	体表面積 1.36m <sup>2</sup> 未満 1日用量 2400mg (8錠)	分2 朝夕食後	PO	DAY 1(夕)～15(朝) または DAY 1(朝)～14(夕)	
			1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満 1日用量 3000mg (10錠)				
			1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満 1日用量 3600mg (12錠)				
			1.96m <sup>2</sup> 以上 1日用量 4200mg (14錠)				

※実施決定後より内服開始

## DAY 1

### 【 末梢 or CVポート 】

- ① NS 50ml / 5min
- ② NS 100ml + **アバステン** \_\_\_\_\_ mg / ( 1コース目：90min、2コース目：60min、3コース目以降：30min )
- ③ NS 50ml / 5min

### \* 注意事項

投与量はC法を適用する

Xeloda + BV療法の**用法・用量、休薬・減量・再開については別紙参照**とする。