

癌化学療法輸液約束処方 大35

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用）

レジメン名 大35 SIR + Cmab

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与方法	投与経路	投与日	1コースの期間
ティ・エス・ワン	ギメラシル・オテラシル・テガフル	TS-1	80 mg/m ²	分2 朝・夕食後	PO	DAY 1(夕)~15(朝) または DAY1(朝)~14(夕)	21日間
イリノテカン	塩酸イリノテカン	CPT-11	150 mg/m ²	1.5 hr	CVポートor 末梢	DAY 1	
アービタックス	セツキシマブ	Cmab	400 mg/m ² (1回目)	2 hr	CVポートor 末梢	DAY 1, 8, 15	
			250 mg/m ² (2回目以降)	1hr		DAY 1, 8, 15	

※実施決定後より内服開始

DAY 1

【 CVポートor末梢 】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A / 15分
- ② NS 50ml + デキサート 1V / 15分
- ③ NS 250ml + アービタックス mg / 2コース目以降 60分
(初回のみ、NS 500ml + アービタックス mg / 120分)
- ④ NS 100ml / 60 分経過観察
- ⑤ NS 50ml + アロキシ 1V / 5分
- ⑥ NS 500 ml + イリノテカン mg / 90分
- ⑦ NS 50ml / 5分

* 注意事項

- ① TS-1はDAY 1の夕食後より内服開始する。

【備考】

- ① 当レジメンは日本医科大学関連病院大腸研究グループにおいて実施されているレジメンである。
- ② 「NACSG-01進行再発大腸癌に対する2次治療としてのIRIS+Cetuximab の多施設共同第二層試験実施計画書」参照

DAY 8, 15

【 CVポートor末梢 】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A / 15分
- ② NS 50ml + デキサート 1V / 15分
- ③ NS 250ml + アービタックス mg / 60分
- ④ NS 100ml / 60 分経過観察

【TS-1の休薬基準】

好中球	1000未満
血小板数	7.5万未満
血清Cre	1.5mg/dL以上
感染	38℃以上の発熱
下痢	Grade 2以上

H26.5.12 作成

R5.9.11 改訂