

癌化学療法輸液約束処方 大 38

癌種 大腸癌 再発・切除不能（外来・入院）

レジメン名 大38 Bev + S-1

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
ティーエスワン	ギメラシル・オテラシル・テガフル	S-1	BSA < 1.25: 80mg/日	分2 朝・夕食後	PO	DAY 1(夕)～29(朝) または DAY1(朝)～28(夕)	42日間
			$1.25 \leq \text{BSA} < 1.50$: 100mg/日				
			$1.50 \leq \text{BSA}$: 120mg/日				
アバスチン	ベバシズマブ	Bev	5 mg/kg	div	1回目: 90分 2回目: 60分 3回目以降: 30分	D1,15,29	

※実施決定後より内服開始

[DAY 1、15、29]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + アバスチン mg / 90分(1回目) → 60分(2回目) → 30分(3回目以降)
- ③ NS 50ml / 5分

[備考]

- 1) アバスチンは主治医の判断で2回目は60分、3回目以降は30分で投与可。
- 2) ベバシズマブによるGrade3以上の有害事象⇒ベバシズマブ中止
- 3) Grade4の有害事象⇒中止
- 4) 好中球 < 500、血小板 < 5万、AST ≥ 200、ALT ≥ 200、Cre ≥ 1.5、Grade3以上の非血液毒性
⇒次コース、ティーエスワン1段階減量(最低用量80mg/日)

H30.3.12作成
R5.9.11改訂