

癌化学療法輸液約束処方 大46

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用） インフューザーポンプ使用

レジメン名 大46 FOLFIRI+Cet

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	1コースの期間
レボホリナート	レボホリナートCa	I-LV	200 mg/m ²	120min	末梢	DAY 1	14日間
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	150 mg/m ²	90min	CVポート	DAY 1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	400 mg/m ²	bolus iv		DAY 1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	1600~2400 mg/m ²	46hr civ		DAY 1	
アービタックス	セツキシマブ	Cet	500 mg/m ²	120min		DAY 1	

DAY 1

【 CVポート 】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A / 15分
- ② NS 50ml + デキサート 2V + グラニセトロン 1A / 15分
- ③ NS 500ml + アービタックス mg / 120分
- ④ NS 50ml / 10分 ラインフラッシュ
- ⑤ NS 100ml / 60分 経過観察
- ⑥ NS 500ml + イリノテカン mg / 90分 **※末梢①と同時投与**
- ⑦ NS 100ml / 30分
- ⑧ NS 50ml + フルオロウラシル mg / 5分
- ⑨ NS ml + フルオロウラシル mg / 計 ml / 46hr civ
※ニプロシユアフューザー使用: SFS-1002D (100ml用)、SFS-5-25 (250ml用)
- ⑩ NS 20ml / シユアフューザー終了時フラッシュ

【休薬基準】 Grade3の副作用

【減量基準】 Grade2以上の副作用

UGT1A1変異あり(20%減量)

【 末梢 】

- ① NS 250ml + レボホリナート mg / 120分 **※CV⑥と同時投与**
- ② NS 50ml / 5分

