

# 癌化学療法輸液約束処方 大47

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用） インフューザーポンプ使用

レジメン名 大47 FOLFOX6+Cet

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	1コースの期間
レボホリナート	レボホリナートCa	I-LV	200 mg/m <sup>2</sup>	120min	末梢	DAY 1	14日間
エルプラット	オキザリプラチン	L-OHP	85 mg/m <sup>2</sup>	120min	CVポート	DAY 1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	400 mg/m <sup>2</sup>	bolus iv		DAY 1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	1600~2400 mg/m <sup>2</sup>	46hr civ		DAY 1	
アービタックス	セツキシマブ	Cet	500 mg/m <sup>2</sup>	120min		DAY 1	

## DAY 1

### 【 CVポート 】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A / 15分
- ② NS 50ml + デキサート 2V + グラニセトロン 1A / 15分
- ③ NS 500ml + アービタックス            mg / 120分
- ④ NS 50ml / 10分 ラインフラッシュ
- ⑤ 5%TZ 100ml / 60分 経過観察
- ⑥ 5%TZ 250ml + エルプラット            mg / 120分 ※末梢①と同時投与
- ⑦ 5%TZ 50ml + フルオロウラシル            mg / 5分
- ⑧ NS            ml + フルオロウラシル            mg / 計            ml / 46hr civ  
 ※ニプロシユアフューザー使用: SFS-1002D (100ml用)、SFS-5-25 (250ml用)
- ⑨ NS 20ml / シユアフューザー終了時フラッシュ

【休薬基準】 Grade3の副作用

【減量基準】 Grade2以上の副作用

### 【 末梢 】

- ① 5%TZ 250ml + レボホリナート            mg / 120 ※CV⑥と同時投与
- ② 5%TZ 50ml / 5分

R5.3.20作成