

癌化学療法輸液約束処方 精胚1

癌種 精巣癌

レジメン名 精胚1 EP (VP-16 + CDDP)

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
エトポシド	エトポシド	VP-16	100 mg/m ²	div	DAY 1-5	-	4週
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	20 mg/m ²	div	DAY 1-5	-	4週

< EP療法前日 >

メイン

- ① ビカネイト 1000 ml + KCL 10ml + 10%NaCl 1A + フロセミド 1A / 12hr
- ② = ① do

< EP吐き気対策 >

NS 50 ml + メトクロプラミド 1A + ヒドロコルチゾン 100 mg / 医師の指示書通り 別々のシリンジで
1日3回まで 8時間以上おいて使用

< EP療法 DAY 1-5 >

メイン

- ① ビカネイト 1000 ml + KCL 10ml + 10%NaCl 1A + フロセミド 1A / 8hr
- ② = ① do
- ③ ヴィーンF 500 ml / 8hr

側管

- 10:00-12:00 ① NS 500 ml + エトポシド mg / 2hr
- 13:30 ② NS 50 ml + グラニセトロン 1A / 5分
- 14:00-16:00 ③ NS 250 ml + シスプラチン mg / 2hr
- 16:00-19:00 ④ マンニトールS 300 ml / 3hr
- 17:30 ⑤ NS 50 ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ⑤終了後すぐ ⑥ NS 50 ml + ファモチジン 1A / 30分

***PVCフリーライン使用、フィルター不可**

< EP療法 DAY 6-7 >

メイン

- ① ビカネイト 1000 ml + KCL 10ml + 10%NaCl 1A + フロセミド 1A / 8hr
- ② = ① do
- ③ ヴィーンF 500 ml / 8hr

2024.10.28改訂