

癌化学療法約束処方 子体15

癌種 子宮体癌
登録No. 子体15 DC+Pem

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
キイトルーダ	ペンブロリズマブ	PEMBRO	200mg/body	div	DAY 1	20日	21日
ドセタキセル	ドセタキセル	DOC	75 mg/m ²				
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5				

【DAY 1】

- ① NS 50 ml / 5分
- ② NS 100 ml + キイトルーダ 200 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50 ml / 5分
- ④ NS 50 ml + デキサート 1V / 5分
- ⑤ NS 50 ml + パロノセトロン 1V + アロカリス 1A / 30分
- ⑥ NS 250 ml + ドセタキセル mg / 60分
- ⑦ NS 250 ml + カルボプラチン mg / 60分
- ⑧ NS 50 ml / 5分

【備考】

MMRステータスによらず適応可。
Pem+DCは6サイクルまで その後Pembro単剤による維持療法へ移行
浮腫対策にデカドロン内服

【減量基準】

Grade3以上の血液毒性
DOC: 75→65→55 CBDCA: AUC5→4

R7.4.7作成