

癌化学療法輸液約束処方 呼85

癌種 小細胞肺癌  
レジメン名 呼85 TAR

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
イムデトラ	タルラタマブ	TAR	Day1: 1mg	div	1コース目: Day1,8,15	28日間
			Day8以降: 10mg		2コース目以降: Day1,15	

[ 1コース目DAY 1 ]

- ① NS 50ml / 10分
- ② NS 50ml + デキサート 1V / 60分
- ③ NS 236ml + イムデトラ 1 mg / 60分
- ④ NS 500ml / 150分
- ⑤ NS 500ml / 150分

[ 1コース目DAY 8、15 ]

- ① NS 50ml / 10分
- ② NS 50ml + デキサート 1V / 60分 (Day8のみ)
- ③ NS 233ml + イムデトラ 10 mg / 60分
- ④ NS 500ml / 150分
- ⑤ NS 500ml / 150分

[ 調製方法 ]

- ①注射用水にて溶解(1mg:1.3mL→1.1mL採取、10mg:4.4mL→4.2mL採取)
- ②輸液安定化液13mLを加えて、計250mLとなるように生食量を調整する

休薬基準: サイトカイン放出症候群(CRS) Gr1/2、免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群(ICANS) Gr 1/2、好中球減少症など

減量基準: CRS Gr3、ICANS Gr3、その他の副作用 Gr3/4

[ 2コース目以降 ]

- ① NS 50ml / 10分
- ② NS 233ml + イムデトラ 10 mg / 60分
- ③ NS 500ml / 60分

[ 備考 ]

① 休薬後再開基準

1コース目Day1から再投与

最終投与: Day1(1mg)から15日以上経過

Day8(10mg)から22日以上経過

Day15(10mg)から29日以上経過

上記日数未満の休薬→同一コース継続

② 1コース目Day1、8は入院管理