

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： OVA-116

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
卵巣がん	Bv +TC tri-weekly	21日間	6コース+α	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	高/中	<GOG-0218>N Engl J Med 365:2473-83,2011 <ICON7>N Engl J Med 365(26):2484-96,2011

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
②	アロカリス パロノセトロン	235mg 0.75mg/50mL	点滴静注	30分	↓																					
①	デキサート	19.8mg	点滴静注	30分	↓																					
	ファモチジン	20mg																								
	ポラミン	5mg																								
	生理食塩液	50mL																								
③	パクリタキセル 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	点滴静注	180分	↓																					
④	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 5～6 250mL	点滴静注	60分	↓																					
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																					
⑥	アバスチン*	15mg/kg	点滴静注	初回 90分	↓																					
	生理食塩液	100mL		2回目 60分																						
				3回目～ 30分																						
⑦	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																					
*Bvは2コース目（以降）から開始（術後の出血の影響を考慮し、初回はBv抜き）																										
＜維持療法＞ 下記2～6コース施行後、下記Bv単独療法を最大21サイクル施行可																										
①	アバスチン 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	30分	↓																					
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																					

<注意事項/備考>

- ✓ PTX：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
- ✓ CBDCA：投与回数を重ねると、ショック、アナフィラキシー様症状の発現頻度が高くなる傾向（8コース前後）