

# 【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： OVA-121

| 対象疾患         | レジメン名称 | コース期間 | 総コース数 | 適応                                                                                                                                                                                        | 催吐<br>リスク | 根拠                            |
|--------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 卵巣がん<br>(再発) | Bv+PLD | 28日間  | 規定なし  | <input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発<br><input type="checkbox"/> 術後補助化学療法<br><input type="checkbox"/> 術前補助化学療法<br><input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法<br><input type="checkbox"/> その他 | 軽度        | J Clin Oncol 32: 1302-8, 2014 |

|   | 薬品名             | 投与量                          | 投与経路 | 投与時間                          | Day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |                 |                              |      |                               | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ① | デキサート<br>生理食塩液  | 6.6mg<br>50mL                | 点滴静注 | 30分                           | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ② | 5%ブドウ糖液         | 50mL                         | 点滴静注 | 5分                            | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ③ | ドキシル<br>5%ブドウ糖液 | 40mg/m <sup>2</sup><br>250mL | 点滴静注 | 60分                           | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ④ | 生理食塩液           | 50mL                         | 点滴静注 | 5分                            | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ④ | アバスチン<br>生理食塩液  | 10mg/kg<br>100mL             | 点滴静注 | 初回 90分<br>2回目 60分<br>3回目～ 30分 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ⑤ | 生理食塩液           | 50mL                         | 点滴静注 | 5分                            | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |                 |                              |      |                               |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |                 |                              |      |                               |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |                 |                              |      |                               |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |                 |                              |      |                               |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |                 |                              |      |                               |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |                 |                              |      |                               |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## ＜注意事項/備考＞

- ✓ Infusion reaction：点滴開始と同時に、解熱鎮痛薬+抗ヒスタミン薬を内服
- ✓ PLD：5%ブドウ糖液で希釈し、1mg/minを超えない速度で投与
- ✓ PLD：総投与量500mg/m<sup>2</sup>以上で、心毒性のリスク増大
- ✓ Bv：出血、創傷治癒遅延あり、原則として術後4週間は投与せず / 血圧上昇（高血圧）に注意（自宅での定期的な測定・記録を）
- ✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与
- ✓