

## 癌化学療法輸液約束処方 胃35

癌種 胃癌 再発・切除不能（通院外来用）  
 レジメン名 胃35 CAPOX+T-mab+Pemb

| 薬品名(商品名) | 一般名      | 略号     | 標準投与量           | 投与方法    | 投与経路 | 投与日                                    | 1コースの期間 |
|----------|----------|--------|-----------------|---------|------|--|---------|
| キイトルーダ   | ペムブロリズマブ | PEMBRO | 200mg/body      | 30分     | DIV  | DAY 1                                  | 21日間    |
| ハーセプチン   | トラスツズマブ  | T-mab  | 初回 8 mg/kg      | 90分     | DIV  | DAY1                                   |         |
|          |          |        | 2回目以降 6 mg/kg   | 30分     |      |  |         |
| エルプラット   | オキサリプラチン | L-OHP  | 130mg/m2        | 120分    | DIV  | DAY 1                                  |         |
| カペシタビン   | カペシタビン   | CAP    | 1日用量 2000mg /m2 | 分2 朝夕食後 | PO   | DAY 1(夕)~15(朝)<br>または<br>DAY1(朝)~14(夕) |         |

※実施決定後より内服開始

### DAY 1

#### 【末梢】

- ① NS 50ml /5分
- ② NS 100ml + キイトルーダ 200 mg /30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml /5分
- ④ NS 250ml + トラスツズマブ mg / (初回)90分 (2回目以降)30分
- ⑤ NS 50ml /5分
- ⑥ 5% TZ 50ml + デキサート 1V / 5分
- ⑦ 5% TZ 50ml + パロノセトロン 1V / 5分
- ⑧ 5% TZ 500 ml + エルプラット mg / 120分
- ⑨ 5% TZ 50ml / 15分

#### 【備考】

PEMBROの休薬基準は共通PEMBRO参照

1コース目はトラスツズマブ投与時にカロナル400mgを併用

#### 【投与開始基準】

- ①好中球:1500/mm<sup>3</sup>以上
- ②血小板:7.5万/mm<sup>3</sup>以上
- ③38℃以上の発熱を認めない
- ④感覚性神経障害:G2以下
- ⑤非血液毒性:G1以下

#### 【L-OHPの減量基準】

- ①好中球:1000/mm<sup>3</sup>未満
- ②血小板:5万/mm<sup>3</sup>未満
- ③発熱性好中球減少症:G3 以上
- ④非血液毒性:G3以上
- ⑤感覚神経障害:コースを超えて継続するG2  
7日以上継続するG3

#### 【カペシタビンの減量基準】

- 好中球 1000未満  
 血小板数 5万未満  
 発熱性好中球減少症:G3 以上  
 HFS G2 以上  
 (G1に回復するまで休薬し、減量して投与開始)