

癌化学療法輸液約束処方 非ホジキンリンパ腫

癌種 悪性リンパ腫
登録No. NHL22 Mosun(SC)+Pola

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	1クール期間
ルンスミオ	モスネツズマブ	Mosun(SC)	1回目:5mg	皮下	1コース目:DAY1,8,15 2コース目以降:DAY1	3週
			2回目以降:45mg			
ポライビー	ポラツズマブ	Pola	1.8mg/kg	div	DAY1	

【1コース目】 DAY1

- ① NS 50ml + デキサート 3V + ポララミン 1A/ 15分
- ② NS 50ml / 5分
- ③ NS 100ml + ポライビー mg / 90分 ☆フィルター使用
(注射用蒸留水20ml:ポライビー溶解用)
- ④ NS 100ml / 90分
- ⑤ ルンスミオ 5 mg / 皮下注

【1コース目】 DAY8,15

- ① ルンスミオ 45 mg / 皮下注

【注意事項】

1. ルンスミオ投与は大腿部。投与後は30分の観察時間を要す
2. Rp.1と同時にカロナール錠併用(600mg)(オプション)
3. 2コース目以降、デキサメタゾン20mg、アセトアミノフェン600mg、ジフェンヒドラミン50mgはオプションで追加(内服)
4. 6週間以上の間隔が空いた場合、5mgから再開が望ましい
5. CRSの際は院内のCRS対策フローチャート参照

< 休薬基準 >

好中球<1000、PLT<50000、FN、CRS、ICANS、低γグロブリン血症、ILD

【2-6コース目】 DAY1

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + ポライビー mg / 30分 ☆フィルター使用
(注射用蒸留水20ml:ポライビー溶解用)
- ③ NS 100ml / 90分
- ④ ルンスミオ 45 mg / 皮下注

【7-8コース目】 DAY1

- ① ルンスミオ 45 mg / 皮下注

R8.5.20作成