

癌化学療法輸液約束処方 非ホジキンリンパ腫

癌種 再発・難治性濾胞性リンパ腫

登録No. NHL23 Mosun(SC)

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	1クール期間
ルンスミオ	モスネツズマブ	Mosun(SC)	1回目:5mg	皮下	1コース目: DAY1,8,15	3週
			2回目以降:45mg		2コース目以降: DAY1	

【1コース目】 DAY1

① [ルンスミオ 5mg](#) / 皮下注

【2-8コース目】 DAY1

① [ルンスミオ 45mg](#) / 皮下注

【1コース目】 DAY8,15

① [ルンスミオ 45mg](#) / 皮下注

【注意事項】

1. ルンスミオ投与は大腿部。投与後は30分の観察時間を要す
2. 1コース目は皮下注開始30分前にデキサメタゾン20mg、アセトアミノフェン600mg、ジフェンヒドラミン50mgを内服
3. 2コース目以降は内服はオプションで追加
4. 6週間以上の間隔が空いた場合、5mgから再開が望ましい
5. CRSの際は院内のCRS対策フローチャート参照

< 休薬基準 >

好中球<1000、PLT<50000、FN、CRS、ICANS、低γグロブリン血症、ILD

R8.9.17作成