

癌化学療法輸液約束処方 胃36

癌種 胃癌/食道胃接合部腺癌 周術期
 レジメン名 胃36 D-FLOT

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与方法	投与経路	投与日	1コースの期間
イミフィンジ	デュルバルマブ	DUL	1,500mg	60分	CVポート	DAY 1	28日間
ドセタキセル	ドセタキセル	DOC	50mg/m ²	60分	CVポート	DAY1,15	
エルプラット	オキザリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	120分	CVポート	DAY1,15	
レボホリナート	レボホリナートCa	1-LV	200mg/m ²	60分	CVポート	DAY1,15	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	2,600mg/m ²	24時間	CVポート	DAY1,15	
ジーラスタ	ベグフィルグラスチム	GCSF	3.6 mg	皮下注		DAY2,16	

【CVポート】

- ① NS 50ml /5分(DAY1のみ)
- ② NS 100ml + イミフィンジ 1.500 mg /60分 ☆フィルター使用(DAY1のみ)
- ③ NS 50ml /5分(DAY1のみ)
- ④ NS 100ml + デキサート 1.5V + パロノセトロン 1V + アロカリス 1V /30分
- ⑤ 5% TZ 250 ml + ドセタキセル mg / 60分 ☆フィルター使用
- ⑥ 5% TZ 250 ml + エルプラット mg / 120分
- ⑦ 5% TZ 250 ml + レボホリナート mg / 60分
- ⑧ フルオロウラシル mg

NS ml 計 ml / 24hr ニプロ シュアーフューザー使用
 終了時NS20mlでフラッシュ

【備考】

- ・手術前後2コース
- ・その後イミフィンジのみ最大10回まで
- ・入院時はジーラスタなし

【休薬基準】

2段階減量(50%)後もGr3以上の血液毒性、非血液毒性。CCr30-40 ml/min以下

【減量基準】

Gr3以上の血液毒性、非血液毒性。CCr30-40 ml/min